

MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 120, DE 9 DE MARÇO DE 2022

Define a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 187, VII, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, em reunião realizada em 9 de março de 2022, resolve:

Art. 1º Ficam instituídas as Listas de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) na forma dos Anexos I e II desta Instrução Normativa, e em atendimento à Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 98, de 1º de agosto de 2016.

§1º As indicações terapêuticas descritas nos Anexos I e II são simplificações daquelas que estão contempladas no texto de bula do profissional de saúde.

§2º Para fins da LMIP constante do Anexo I, considera-se que:

I - A caracterização de um medicamento como isento de prescrição ocorre para um produto com o mesmo IFA (ou associação), forma farmacêutica, indicação(ões) terapêutica(s) e com concentração igual ou inferior àqueles indicados em cada linha da LMIP;

II - A coluna 'concentração máxima' refere-se à dose do insumo farmacêutico ativo presente na forma farmacêutica, não se referindo à dose posológica.

§3º Para fins da LMIP constante do Anexo II, considera-se que a caracterização de um fitoterápico como isento de prescrição ocorre para um produto com a mesma espécie, parte empregada e indicação(ões) terapêutica(s) tendo por base cada linha da LMIP.

Art. 2º Revoga-se a Instrução Normativa - IN nº 86, de 12 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 51, de 17 de março de 2021, Seção 1, pág. 251.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de abril de 2022.

ANTÔNIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente

ANEXO I

LISTA DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO (LMIP)

Medicamentos Sintéticos, Específicos e Biológicos

| n | Fármaco | Subgrupo terapêutico ou farmacológico | Forma farmacêutica | Concentração máxima | Indicação terapêutica simplificada |
|---|--------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1 | Aceclofenaco | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Creme dermatológico | 15 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|----------------------|---|
| 2 | Acetato de hidrocortisona | D07A - Corticosteroides (isolados) de uso local | Creme dermatológico, pomada dermatológica | 10 mg/g | Dermatites, eczemas, eritema solar, queimadura de primeiro grau e picadas de inseto. |
| 3 | Acetilcisteína | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Comprimido efervescente, granulado | 600 mg | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares. |
| 4 | Acetilcisteína | R01A - Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local | Solução nasal | 11,5 mg/mL | Congestão nasal associada a rinites ou após procedimentos cirúrgicos no nariz. |
| 5 | Acetilcisteína | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Solução oral | 40 mg/mL | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares. |
| 6 | Acetilracemetonina + citrato de colina + betaina | A05B - Terapia biliar, lipotrópicos | Solução oral | 40 + 53 + 50 mg/mL | Distúrbios metabólicos hepáticos. |
| 7 | Ácido acetilsalicílico | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 500 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas com cólicas menstruais e a gripes e resfriados comuns. |
| 8 | Ácido acetilsalicílico | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido de liberação prolongada | 500 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas com cólicas menstruais e a gripes e resfriados comuns. |
| 9 | Ácido acetilsalicílico + ácido ascórbico (Vit. C) | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 400 + 200 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre e cefaleia. |
| 10 | Ácido acetilsalicílico + ácido ascórbico (Vit. C) | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido efervescente | 400 + 240 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre e cefaleia. |
| 11 | Ácido acetilsalicílico + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 650 + 65 mg | Dores moderadas a fortes. |
| 12 | Ácido acetilsalicílico + maleato de clorfeniramina + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Cápsula dura | 324 + 2 + 32,4 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 13 | Ácido acetilsalicílico + maleato de dexclorfeniramina + cloridrato de fenilefrina + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 400 + 1 + 10 + 30 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 14 | Ácido acetilsalicílico + paracetamol + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido | 250 + 250 + 65 mg | Dores leves a moderadas, incluindo as associadas com cólicas menstruais e a gripes e resfriados comuns. |
| 15 | Ácido azelaico | D10A - Preparações antiacne de uso local | Creme dermatológico | 200 mg/g | Acne vulgar. |
| 16 | Ácido azelaico | D10A - Preparações antiacne de uso local | Gel dermatológico | 150 mg/g | Acne vulgar. Rosácea papulopustulosa. |
| 17 | Ácido benzóico + ácido | D01A - Antifúngicos de | Solução | 20 + 20 + 2,5 | Micoses superficiais da |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|---|--|
| | salicílico + iodo metálico | uso local | dermatológica | mg/mL | pele. |
| 18 | Ácido bórico + ácido salicílico + enxofre + óxido de zinco | D01A - Antifúngicos de uso local | Pó dermatológico | 3,0 + 0,352 + 17,602 + 11,735 g | Dermatite de fraldas. Brotoeja. Desodorante e antiperspirante de pés e axilas. Prevenção de frieiras e pruridos na pele. |
| 19 | Ácido salicílico | D11A - Outras preparações dermatológicas | Gel dermatológico | 270 mg/g | Tratamento e remoção das verrugas comuns. |
| 20 | Ácido undecilênico + undecilenato de sódio + ácido propiônico + propionato de sódio + hexilresorcinol | D01A - Antifúngicos de uso local | Solução dermatológica | 40 + 150 + 30 + 50 + 0,5 mg/mL | Micoses superficiais de pele e unha. |
| 21 | Ácido undecilênico + undecilenato de zinco + propionato de cálcio + hexilresorcinol | D01A - Antifúngicos de uso local | Pó dermatológico | 2 + 150 + 60 + 0,5 mg/g | Micoses de pele, frieira, de unha, vulvar e peniana, dermatite seborreica, pitiríase versicolor. |
| 22 | Alantoína + triclosana + óxido de zinco | D01A - Antifúngicos de uso local | Pó dermatológico | 5 + 1 + 100 mg/g | Dermatite de fraldas. Eczemas, brotoejas, queimaduras e outras irritações superficiais da pele. |
| 23 | Álcool polivinílico | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Solução oftálmica | 14 mg/mL | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 24 | Alfaestradiol | G03C - estrógenos | Solução capilar | 0,25 mg/ml | Tratamento e prevenção da alopecia androgenética. |
| 25 | Alginato de sódio + bicarbonato de potássio | A02A - Antiácidos | Suspensão oral | 100 + 20 mg/mL | Alívio da regurgitação ácida, azia e dor de estômago devido à má digestão. |
| 26 | Alginato de sódio + bicarbonato de sódio + carbonato de cálcio | A02A - Antiácidos | Comprimido mastigável | 250 + 133,5 + 80 mg | Alívio da azia, dor de estômago devido à má digestão, enjoo e vômito. |
| 27 | Alginato de sódio + bicarbonato de sódio + carbonato de cálcio | A02A - Antiácidos | Suspensão oral | 50 + 26,7 + 16 mg/mL | Alívio da azia, dor de estômago devido à má digestão, enjoo e vômito. |
| 28 | Ascorbato de sódio + colestiferol + citrato de zinco tri-hidratado | A11GB - Ácido ascórbico, incluindo combinações | Comprimido revestido | 1000 mg + 455 UI + 10 mg | Prevenção e tratamento das infecções do trato respiratório, tais como gripes e resfriados comuns, através do reforço do sistema imune e ação antioxidante. |
| 29 | <i>Bacillus cereus</i> | A07F - Microrganismos antidiarreicos | Suspensão oral | 1 X 10 ⁶ end/mL | Coadjuvante no tratamento da diarreia; coadjuvante em enterocolites crônicas e agudas. |
| 30 | Bicarbonato de sódio + carbonato de magnésio + carbonato de cálcio + carbonato básico de bismuto | A02A - Antiácidos | Granulado | 586,742 + 134,34 + 134,34 + 32,495 mg/g | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão. |
| 31 | Bicarbonato de sódio + carbonato de magnésio + carbonato de cálcio + carbonato básico de | A02A - Antiácidos | Pastilha | 63,7 + 67 + 521 + 3,3 mg | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------------------|--|
| | bismuto | | | | |
| 32 | Bicarbonato de sódio + carbonato de magnésio + carbonato de cálcio + carbonato básico de bismuto | A02A - Antiácidos | Pó para solução oral | 649 + 146,67 + 146,67 + 35,8 mg/g | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão. |
| 33 | Bicarbonato de sódio + carbonato de sódio | A02A - Antiácidos | Granulado efervescente | 462 + 90 mg/g | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão. |
| 34 | Bicarbonato de sódio + carbonato de sódio + ácido acetilsalicílico + ácido cítrico | A02A - Antiácidos | Comprimido efervescente | 1854 + 400 + 325 + 1413 mg | Alívio da azia, dor de estômago e cefaleia devido à má digestão. |
| 35 | Bicarbonato de sódio + carbonato de sódio + ácido cítrico | A02A - Antiácidos | Granulado efervescente, pó efervescente | 462,15 + 100 + 440 mg/g | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão. |
| 36 | Bisacodil | A06A - Laxantes | Comprimido revestido, comprimido revestido de liberação retardada | 5 mg | Laxativo. Prisão de ventre. Sob orientação de profissional de saúde: preparo diagnóstico ou cirúrgico. |
| 37 | Bromidrato de dextrometorfano | R05D - Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes | Solução oral | 3 mg/mL | Tosse seca, sem catarro associada a gripes e resfriados ou à inalação de agentes irritantes. |
| 38 | Butilbrometo de escopolamina | A03B - Belladonna e derivados (isolados) | Comprimido revestido | 10 mg | Alívio de cólicas gastrintestinais, das vias biliares, dos órgãos sexuais e das vias urinárias. |
| 39 | Butilbrometo de escopolamina | A03B - Belladonna e derivados (isolados) | Solução oral | 10 mg/mL | Alívio de cólicas gastrintestinais, das vias biliares, dos órgãos sexuais e das vias urinárias. |
| 40 | Butilbrometo de escopolamina + dipirona | A03D - Antiespasmódicos em associação com analgésicos | Comprimido revestido | 10 + 250 mg | Alívio de cólicas gastrintestinais, das vias biliares, dos órgãos sexuais e das vias urinárias. |
| 41 | Butilbrometo de escopolamina + dipirona | A03D - Antiespasmódicos em associação com analgésicos | Solução oral | 6,667 + 333,4 mg/mL | Alívio de cólicas gastrintestinais, das vias biliares, dos órgãos sexuais e das vias urinárias. |
| 42 | Butilbrometo de escopolamina + paracetamol | A03D - Antiespasmódicos em associação com analgésicos | Comprimido revestido | 10 + 500 mg | Alívio de cólicas gastrintestinais, das vias biliares, dos órgãos sexuais e das vias urinárias. |
| 43 | Cânfora | D04A - Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos e outros de uso local | Tablete dermatológico | 712 mg | Irritações da pele. |
| 44 | Cânfora + eucaliptol + mentol + guaiacol | R05X - Outros produtos para gripe e resfriados | Pomada dermatológica | 25 + 100 + 50 + 10 mg/g | Congestão nasal e tosse associadas a gripes e |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|---|--|
| | | | | | resfriados. |
| 45 | Carbocisteína | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Solução oral | 50 mg/mL | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares. |
| 46 | Carbômer + sorbitol | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Gel oftálmico | 2 + 48,5 mg/g | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 47 | Carbômer 940 | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Gel Oftálmico | 2,0 mg/g | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 48 | Carbonato de cálcio | A02A - Antiácidos | Comprimido mastigável | 750 mg | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão. |
| 49 | Carbonato de cálcio + hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio | A02A - Antiácidos | Comprimido mastigável | 230 + 178 + 185 mg; ou 231,5 + 159,9 + 208,9 mg | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão, enjôo e vômito. |
| 50 | Carbonato de cálcio + hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio | A02A - Antiácidos | Pastilha | 231,5 + 178 + 185 mg | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão, enjôo e vômito. |
| 51 | Carmelose sódica | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Solução oftálmica | 10 mg/mL | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 52 | Cetoconazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 20 mg/g | Micoses superficiais de pele. |
| 53 | Cetoconazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Xampu | 20 mg/mL | Dermatite seborreica. |
| 54 | Citrato de colina + betaína + racemetionina | A05B - Terapia biliar, lipotrópicos | Solução oral | 100 + 50 + 10 mg/mL | Distúrbios metabólicos hepáticos. |
| 55 | Cloreto de benzalcônio + ácido bórico | S01AX - Outros produtos antiinfeciosos oftálmicos | Solução oftálmica | 0,1 + 17 mg/mL | Irritação e prurido oculares causados por exposição a agentes irritantes. Higiene dos olhos. |
| 56 | Cloreto de benzalcônio + óxido de zinco + cânfora | D02A - Emolientes e protetores de uso local D03A - Cicatrizantes de uso local D08A - Antissépticos e desinfetantes de uso local | Pomada dermatológica | 5 + 200 + 50 mg/g | Acne vulgar, frieiras, picadas de insetos, urticárias, ferimentos leves e escoriações, escaras. Desodorante e antiperspirante de axilas e pés. |
| 57 | Cloreto de cetilpiridínio | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 1,34 mg | Inflamações e dores na mucosa da boca e garganta. |
| 58 | Cloreto de cetilpiridínio + benzocaína | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 1,466 + 10 mg | Inflamações e dores na mucosa da boca e garganta. |
| 59 | Cloreto de cetilpiridínio + benzocaína | R02A - Preparações para a garganta | Solução | 0,5 + 4 mg/mL | Inflamações e dores na mucosa da boca e garganta. |
| 60 | Cloreto de cetilpiridínio + borato de sódio + benzocaína | R02A - Preparações para a garganta | Solução | 1 + 60 + 0,2 mg/mL | Inflamações e dores na mucosa da boca e garganta. |
| 61 | Cloreto de cetilpiridínio + cloreto de cetalcônio | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 1,25 + 1,25 mg | Inflamações e dores na mucosa da boca e garganta. |
| 62 | Cloreto de dequalínio + benzocaína | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 0,25 + 5 mg | Inflamações e dores na mucosa da boca e |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | | | | garganta. |
| 63 | Cloreto de sódio | R01A - Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local | Gel nasal | 6,0 mg/g | Mucosa nasal ressecada e irritada. |
| 64 | Cloreto de sódio | R01A - Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local | Solução nasal | 30 mg/mL | Congestão nasal. Mucosa nasal ressecada e irritada. |
| 65 | Cloreto de sódio + gliconato de zinco + glicose + citrato de sódio + citrato de potássio | A07C - Eletrólitos com carboidratos | Solução oral | 2,076 + 0,061 + 25 + 0,94 + 2,16 mg/mL | Reidratação ou manutenção da hidratação na diarreia aguda. |
| 66 | Cloreto de sódio + gliconato de zinco + glicose + citrato de sódio + citrato de potássio | A07C - Eletrólitos com carboidratos | Solução oral | 1,757 + 0,06 + 11,88 + 2,892 + 1,506 mg/mL | Reidratação ou manutenção da hidratação na diarreia aguda. |
| 67 | Cloridrato de ambroxol | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Cápsula dura de liberação prolongada | 75 mg | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares. |
| 68 | Cloridrato de ambroxol | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Solução oral | 7,5 mg/mL | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares. |
| 69 | Cloridrato de amorolfina | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 2,5 mg/g | Micoses superficiais de pele. |
| 70 | Cloridrato de amorolfina | D01A - Antifúngicos de uso local | Esmalte | 50 mg/mL | Micoses de unha. |
| 71 | Cloridrato de azelastina | R01A - Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local | Solução nasal | 1 mg/mL | Rinite alérgica. |
| 72 | cloridrato de benzidamina | R02A - Preparações para a garganta | Colutório | 1,5 mg/mL | Inflamações e dores na mucosa da boca, língua e garganta. |
| 73 | Cloridrato de benzidamina | A01A - Preparações bucais | Creme | 5 mg/g | Inflamações e dores na mucosa da boca e garganta. |
| 74 | Cloridrato de benzidamina | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 3,15 mg | Inflamações e dores na mucosa da boca e garganta. |
| 75 | Cloridrato de bromexina | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Solução oral | 2 mg/mL | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares. |
| 76 | Cloridrato de bromexina | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Xarope | 1,6 mg/mL | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias, decorrentes ou associadas a doenças broncopulmonares. |
| 77 | Cloridrato de butenafina | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 10 mg/g | Micoses superficiais de pele. |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|--------------------------|---|
| 78 | Cloridrato de clobutinol | R05D - Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes | Solução oral | 4 mg/mL | Tosse seca, sem catarro. |
| 79 | Cloridrato de difenidramina + cloreto de amônio + citrato de sódio | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 5 + 50 + 10 mg | Tosse. Irritações da garganta, faringites. |
| 80 | Cloridrato de difenidramina + cloreto de amônio + citrato de sódio | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 2,5 + 25 + 11,25 mg/mL | Tosse. Irritações da garganta, faringites. |
| 81 | Cloridrato de epinastina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido revestido | 20 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele, eczemas. |
| 82 | Cloridrato de epinastina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 2 mg/mL | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele, eczemas. |
| 83 | Cloridrato de fenazopiridina | G04B - Urológicos | Comprimido revestido | 200 mg | Dor, ardor, desconforto para urinar. |
| 84 | Cloridrato de fexofenadina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido revestido | 180 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 85 | Cloridrato de fexofenadina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Suspensão oral | 6 mg/mL | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 86 | Cloridrato de isotipendil | D04A - Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos e outros de uso local | Gel dermatológico | 7,5 mg/g | Prurido. Picada de insetos. |
| 87 | Cloridrato de levamisol | P02C - Antinematóides | Comprimido | 150 mg | Ascaridíase. |
| 88 | Cloridrato de lidocaína + cloreto de benzetônio | D08A - Antissépticos e desinfetantes de uso local | Solução dermatológica | 25 + 1,3 mg/mL | Ferimentos superficiais na pele. |
| 89 | Cloridrato de nafazolina + maleato de feniramina | S01G - Descongestionantes e antialérgicos oftálmicos | Solução oftálmica | 0,25 + 3 mg/mL | Irritação e prurido oculares causados por exposição a agentes irritantes. |
| 90 | Cloridrato de nafazolina + sulfato de zinco heptaidratado | S01G - Descongestionantes e antialérgicos oftálmicos | Solução oftálmica | 0,15 + 0,3 mg/mL | Irritação e prurido oculares causados por exposição a agentes irritantes. |
| 91 | Cloridrato de oxomemazina + iodeto de potássio + benzoato de sódio + guaifenesina | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 0,4 + 20 + 4 + 6 mg/mL | Tosse seca, sem catarro. |
| 92 | Cloridrato de papaverina + dipirona + extrato fluido de Atropa belladonna | A03D - Antiespasmódicos em associação com analgésicos | Comprimido | 30 mg + 250 mg + 0,03 mL | Alívio de cólicas gastrintestinais, das vias biliares, dos órgãos sexuais e das vias urinárias. |
| 93 | Cloridrato de procaína + timol + mentol + cânfora | A01A - Preparações bucais | Solução | 1 + 4 + 8 + 2 mg/mL | Alívio da dor de dente. |
| 94 | Cloridrato de terbinafina | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 10 mg/g | Micoses superficiais de pele. |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|----------|---|
| 95 | Cloridrato de terbinafina | D01A - Antifúngicos de uso local | Solução dermatológica | 10 mg/mL | Micoses superficiais de pele. |
| 96 | Clotrimazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 10 mg/g | Micoses superficiais de pele, dermatite seborreica, candidíase vulvar e peniana. |
| 97 | Clotrimazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Solução dermatológica | 10 mg/mL | Micoses superficiais de pele, dermatite seborreica, candidíase vulvar e peniana. |
| 98 | Clotrimazol | G01A - Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos, excluindo associações com corticosteroides | Cápsula mole vaginal, comprimido vaginal | 500 mg | Candidíase vaginal. |
| 99 | Clotrimazol | G01A - Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos, excluindo associações com corticosteroides | Creme vaginal | 20 mg/g | Candisíase vaginal e peniana. |
| 100 | Coaltar | D01A - Antifúngicos de uso local D05A - Antipsoriásicos de uso local | Xampu | 40 mg/mL | Caspa. Oleosidade do couro cabeludo. Dermatite seborreica, psoríase e eczema do couro cabeludo. |
| 101 | Cobamamida + cloridrato de ciproptadina | A15 - Estimulantes do apetite | Comprimido | 1 + 4 mg | Estimulante do apetite. Estado de fraqueza e diminuição do apetite. Períodos de convalescença. |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|-----------------|---|
| 102 | Colagenase | D03B - Enzimas de uso local | Pomada dermatológica | 1,2 U/g | Ferimentos leves e escoriações. Escaras. Fissuras da pele. |
| 103 | Deltametrina | P03A - Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas | Emulsão dermatológica, suspensão dermatológica, xampu | 0,2 mg/mL | Pediculose, ftíriase, escabiose, infestações por carrapatos. |
| 104 | Desloratadina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido revestido | 5 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 105 | Desloratadina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 1,25 mg/mL | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 106 | Dextrana + hipromelose | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Solução oftálmica | 1 + 3 mg/mL | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 107 | Dextrana + hipromelose + glicerol | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Solução oftálmica | 1 + 3 + 2 mg/mL | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 108 | Diclofenaco dietilamônio | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Gel dermatológico | 23,2 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 109 | Diclofenaco dietilamônio | M02A - Produtos para dor articular e muscular | Solução dermatológica | 11,6 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | de uso local | | | |
| 110 | Diclofenaco sódico | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Gel dermatológico | 10 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 111 | Dicloridrato de levocetirizina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido revestido | 5 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 112 | Dicloridrato de levocetirizina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 5 mg/mL | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 113 | Dipirona | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido, comprimido efervescente | 1000 mg | Dor e febre. |
| 114 | Dipirona | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Solução oral | 500 mg/mL | Dor e febre. |
| 115 | Dipirona | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Supositório | 300 mg | Dor e febre. |
| 116 | Dipirona + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 500 + 65 mg | Cefaleia e enxaqueca. |
| 117 | Dipirona + citrato de orfenadrina + cafeína | M03B - Relaxantes musculares de ação central | Comprimido | 300 + 35 + 50 mg | Dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. |
| 118 | Dipirona + citrato de orfenadrina + cafeína | M03B - Relaxantes musculares de ação central | Solução oral | 300 + 35 + 50 mg/mL | Dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. |
| 119 | Dipirona + cloridrato de isometepteno + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Solução oral | 300 + 50 + 30 mg/mL | Cefaleia, enxaqueca e cólicas abdominais. |
| 120 | Dipirona + cloridrato de prometazina + cloridrato de adifenina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 500 + 5 + 10 mg | Febre e dores leves a moderadas. |
| 121 | Dipirona + cloridrato de prometazina + cloridrato de adifenina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Solução oral | 333,333 + 3,333 + 6,666 mg/mL | Febre e dores leves a moderadas. |
| 122 | Dipirona + maleato de clorfeniramina + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido | 500 + 2 + 30 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 123 | Dipirona + mucato de isometepteno + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido | 300 + 30 + 30 mg | Cefaleia, enxaqueca e cólicas abdominais. |
| 124 | Docusato sódico + bisacodil | A06A - Laxantes | Comprimido revestido | 60 + 5 mg | Laxativo. Prisão de ventre. Sob orientação de profissional de saúde: preparo diagnóstico ou cirúrgico. |
| 125 | Dropropizina | R05D - Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes | Solução oral | 30 mg/mL | Tosse seca, sem catarro. |
| 126 | Ebastina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido revestido | 10 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 127 | Ebastina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 1 mg/mL | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|--|
| 128 | Essência de terebentina + salicilato de metila + cânfora + mentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Gel dermatológico | 0,2222 + 0,0444 mL/g + 44,4 + 98 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 129 | Eucaliptol + terpina monoidratada + mentol | R05X - Outros produtos para gripe e resfriados | Solução inalatória | 33 + 22 + 22 mg/mL | Secreções mucosas densas e viscosas nas vias respiratórias. |
| 130 | Fendizoato de cloperastina | R05D - Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes | Suspensão oral | 35,4 mg/mL | Tosse seca, sem catarro. |
| 131 | Fendizoato de cloperastina | R05D - Antitussígenos, excluindo associações com expectorantes | Solução oral | 3,54 mg/mL | Tosse seca, sem catarro. |
| 132 | Fenol + mentol | S02D - Outros produtos otológicos | Solução otológica | 18,6 + 1,3 mg/mL | Dor de ouvido. Remoção de cerume. |
| 133 | Flurbiprofeno | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 8,75 mg | Inflamação da garganta. |
| 134 | Flutrimazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 10 mg/g | Micoses superficiais de pele. |
| 135 | Flutrimazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Solução dermatológica | 10 mg/mL | Micoses superficiais de pele. |
| 136 | Guaifenesina | R05C - Expectorantes, excluindo associações com antitussígenos | Solução oral | 16 mg/mL | Tosse associada a gripes e resfriados. |
| 137 | Guaifenesina + bromidrato de dextrometorfano | R05F - Antitussígenos associados a expectorantes | Solução oral | 13,3 + 1,3 mg/mL | Tosse com ou sem catarro associada a gripes e resfriados. |
| 138 | Heparina sódica | C05B - Terapia antivaricosa | Gel dermatológico | 200 U/g | Flebites e tromboflebites superficiais, hematomas e contusões, dor pós escleroterapia venosa. |
| 139 | Hialuronato de sódio | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Solução oftálmica | 1,5 mg/mL | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 140 | Hidróxido de alumínio | A02A - Antiácidos | Comprimido, comprimido mastigável | 230 mg | Alívio da azia devido à má digestão. |
| 141 | Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio | A02A - Antiácidos | Pó efervescente | 35,6 + 37 mg/g | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão, enjôo, vômito e distensão abdominal. |
| 142 | Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + carbonato de cálcio | A02A - Antiácidos | Comprimido mastigável, pó efervescente | 178 + 185 + 230 mg | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão, enjôo, vômito e distensão abdominal. |
| 143 | Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + carbonato de cálcio | A02A - Antiácidos | Suspensão oral | 35,6 + 37 + 48,4 mg/mL | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão, enjôo, vômito e distensão abdominal. |
| 144 | Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + oxetacaína | A02A - Antiácidos | Suspensão oral | 60 + 20 + 2 mg/mL | Alívio da regurgitação ácida, azia e dor de estômago devido à má digestão e distensão abdominal. |
| 145 | Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona | A02A - Antiácidos | Suspensão oral | 120 + 41,5 + 7 mg/mL | Alívio da azia, eructação e flatulência. |
| 146 | Hidroxiquinolina + | S02D - Outros produtos | Solução | 0,4 + 140 | Dor de ouvido. Remoção de |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|
| | trolamina | otológicos | otológica | mg/mL | cerume. |
| 147 | Hipromelose | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Solução oftálmica | 5 mg/mL | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 148 | Hipromelose + cetrimida | S01X - Outros produtos oftalmológicos | Solução oftálmica | 3,2 + 0,1 mg/mL | Lubrificante oftálmico / lágrima artificial. |
| 149 | Ibuprofeno | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Cápsula gelatinosa mole, comprimido | 400 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 150 | Ibuprofeno | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido | 400 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 151 | Ibuprofeno | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Suspensão oral | 100 mg/mL | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 152 | Ibuprofeno | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido de liberação prolongada | 600 mg (200 mg liberação imediata + 400 mg liberação prolongada) | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns, musculares, cefaleia, enxaqueca e traumatismos. |
| 153 | Ibuprofeno + paracetamol | M01A - Antiinflamatórios e antirreumáticos não esteroidais | Comprimido revestido | 200 + 500 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns, musculares, cefaleia, enxaqueca e cólicas abdominais. |
| 154 | Ibuprofeno arginina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido, granulado | 770 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns e traumatismos. |
| 155 | Iodo + óleo de cade + ácido salicílico | D08A - Antissépticos e desinfetantes de uso local | Solução dermatológica | 10 + 10 + 20 mg/mL | Micoses superficiais de pele. |
| 156 | Iodopovidona | D08A - Antissépticos e desinfetantes de uso local | Pomada dermatológica | 100 mg/g | Ferimentos superficiais na pele. |
| 157 | Iodopovidona | D08A - Antissépticos e desinfetantes de uso local | Sabonete | 7 mg/g | Higienização das mãos e corpo. Ferimentos superficiais na pele. Afecções cutâneas. |
| 158 | Lactulose | A06A - Laxantes | Solução oral, xarope | 667 mg/mL | Laxativo. Prisão de ventre. Encefalopatia hepática. |
| 159 | Levomentol + cânfora | R01A - Descongestionantes e outras preparações nasais de uso local | Óleo nasal | 415,4 + 415,4 mg/mL | Congestão nasal. |
| 160 | Levomentol + cânfora + óleo de eucalipto | R05X - Outros produtos para gripe e resfriados | Pomada | 28,2 + 52,6 + 13,3 mg/g | Congestão nasal, tosse e dor muscular associadas à gripes e resfriados. |
| 161 | Loratadina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Cápsula gelatinosa mole | 10 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------------------------------|--|
| 162 | Loratadina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido, comprimido revestido | 10 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 163 | Loratadina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 1 mg/mL | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele. |
| 164 | Loxoprofeno sódico | M01A - Antiinflamatórios e antirreumáticos não esteroidais | Adesivo transdérmico | 100 mg | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 165 | Macrogol + bicarbonato de sódio + cloreto de potássio + cloreto de sódio | A06A - Laxantes | Pó | 13,125 + 0,1775 + 0,0466 + 0,3507 g | Laxativo. Prisão de ventre. Sob orientação de profissional de saúde: preparo diagnóstico ou cirúrgico. |
| 166 | Magaldrato | A02A - Antiácidos | Suspensão oral | 80 mg/mL | Alívio da azia devido à má digestão. |
| 167 | Magaldrato + simeticona | A02A - Antiácidos | Suspensão oral | 80 + 10 mg/mL | Alívio da azia, eructação e flatulência. |
| 168 | Maleato de bronfeniramina + cloridrato de fenilefrina | R01B - Descongestionantes nasais para uso sistêmico | Comprimido revestido de liberação prolongada | 12 + 15 mg | Sintomas de gripe, resfriado, rinite e sinusite, alérgicas ou não. |
| 169 | Maleato de bronfeniramina + cloridrato de fenilefrina | R01B - Descongestionantes nasais para uso sistêmico | Solução oral | 2 + 2,5 mg/mL | Sintomas de gripe, resfriado, rinite e sinusite, alérgicas ou não. |
| 170 | Maleato de bronfeniramina + cloridrato de fenilefrina | R01B - Descongestionantes nasais para uso sistêmico | Solução oral | 0,4 + 1 mg/mL | Sintomas de gripe, resfriado, rinite e sinusite, alérgicas ou não. |
| 171 | Maleato de clorfeniramina + ácido ascórbico + dipirona monoidratada | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido | 1 + 50 + 100 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor no corpo, cefaleia e coriza. Sintomas de distúrbios do estado geral decorrentes de alterações climáticas e de abuso de álcool ou nicotina. |
| 172 | Maleato de dexclorfeniramina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido, comprimido revestido | 2 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele, eczemas. Picada de insetos. Conjutivite alérgica. Dermatite atópica. |
| 173 | Maleato de dexclorfeniramina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Creme dermatológico | 10 mg/g | Prurido. Eczemas/dermatites alérgicas. Urticária. Picada de insetos. |
| 174 | Maleato de dexclorfeniramina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Comprimido revestido de liberação prolongada | 6 mg | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele, eczemas. Picada de insetos. Conjutivite alérgica. Dermatite atópica. |
| 175 | Maleato de dexclorfeniramina | R06A - Anti-histamínicos para uso sistêmico | Solução oral | 2,8 mg/mL | Sintomas da rinite alérgica. Sintomas de urticária ou alergias de pele, eczemas. Picada de insetos. Conjutivite alérgica. |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|-------------------------|--|
| | | | | | Dermatite atópica. |
| 176 | Maleato de mepiramina + hidróxido de alumínio + ácido acetilsalicílico + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos R06A - Antihistamínicos para uso sistêmico | Comprimido | 15 + 150 + 150 + 50 mg | Cefaleia e alergias. |
| 177 | Mebendazol | P02C - Antinematóides | Comprimido | 500 mg | Enterobíase, tricuriase, ascaridíase, ancilostomíase, necatoríase, teníase. |
| 178 | Mebendazol | P02C - Antinematóides | Suspensão oral | 20 mg/mL | Enterobíase, tricuriase, ascaridíase, ancilostomíase, necatoríase, teníase. |
| 179 | Metronidazol | D06B - Quimioterápicos de uso local | Creme dermatológico, gel dermatológico | 7,5 mg/g | Rosácea. |
| 180 | Naproxeno | M01A - Antiinflamatórios e antirreumáticos não esteroidais | Comprimido | 500 mg | Dores agudas causadas por inflamação; dor e febre, incluindo às associadas a sintomas de gripe e resfriado; dores musculares e articulares; dor após traumas. |
| 181 | Naproxeno sódico | M01A - Antiinflamatórios e antirreumáticos não esteroidais | Comprimido revestido | 550 mg | Dores agudas causadas por inflamação; dor e febre, incluindo às associadas a sintomas de gripe e resfriado; dores musculares e articulares; dor após traumas. |
| 182 | Nicotina | N07B - Transtornos de dependência (vício) | Adesivo transdérmico | 21 mg | Dependência do tabaco. Sintomas da síndrome de abstinência de nicotina. |
| 183 | Nicotina | N07B - Transtornos de dependência (vício) | Pastilha, goma de mascar | 4 mg | Dependência do tabaco. Sintomas da síndrome de abstinência de nicotina. |
| 184 | Nimesulida | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Gel dermatológico | 20mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 185 | Nistatina + óxido de zinco | D01A - Antifúngicos de uso local | Pomada dermatológica | 100.000U.I./g + 200mg/g | Dermatite de fraldas. Irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, nas axilas, sob os seios ou em outras áreas da pele que sofrem atrito em crianças e adultos. |
| 186 | Nitrato de miconazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico, pó dermatológico | 20 mg/g | Micoses superficiais de pele e unha. |
| 187 | Nitrato de miconazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Emulsão dermatológica, suspensão dermatológica | 20 mg/mL | Dermatite de fraldas. Micoses superficiais de pele e unha. |
| 188 | Nitrato de miconazol | G01A - Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos, excluindo associações | Creme vaginal | 20 mg/g | Candidíase vaginal e perianal. |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|--|
| | | com corticosteroides | | | |
| 189 | Nitrato de oxiconazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 10,0 mg/g | Micoses superficiais de pele, dermatite seborreica, candidíase vulvar e peniana e infecções mistas por fungos e bactérias. |
| 190 | Nitrato de oxiconazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Solução dermatológica | 10,0 mg/mL | Micoses superficiais de pele, dermatite seborreica, candidíase vulvar e peniana e infecções mistas por fungos e bactérias. |
| 191 | Óxido de zinco + salicilato de fenila + ácido bórico + enxofre + mentol + cânfora | D01A - Antifúngicos de uso local | Pó dermatológico | 10 + 2,0 + 5,0 + 5,0 + 0,2 + 1,0 mg/g | Dermatite de fraldas. Brotoeja. Desodorante e antiperspirante de pés e axilas. Prevenção de frieiras e pruridos na pele. |
| 192 | Palmitato de retinol (Vit. A) + colecalciferol (Vit. D3) + acetato de racealfatocoferol (Vit. E) + alantoína | D02A - Emolientes e protetores de uso local | Creme dermatológico | 5000 + 1000 + 20 UI/g + 2 mg/g | Pele seca e áspera. Irritações da pele de pequena intensidade provocadas pela exposição ao sol. |
| 193 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido efervescente | 500 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 194 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido mastigável | 160 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 195 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido | 750 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 196 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido revestido de liberação prolongada | 650 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 197 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 750 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 198 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Pó | 100 mg/g | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 199 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Solução oral | 200 mg/mL | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 200 | Paracetamol | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Suspensão oral | 140 mg/mL | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |
| 201 | Paracetamol + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido efervescente, comprimido revestido | 500 + 65 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas a gripes e resfriados comuns. |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|----------------------|--|
| 202 | Paracetamol + carisoprodol + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 350 + 150 + 50 mg | Dores musculares leves a moderadas. |
| 203 | Paracetamol + citrato de orfenadrina + cafeína | M03B - Relaxantes musculares de ação central | Comprimido | 450 + 35 + 50 mg | Dores leves a moderadas associadas a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. |
| 204 | Paracetamol + cloridrato de fenilefrina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 800 + 20 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 205 | Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de carbinoxamina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 800 + 20 + 4 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 206 | Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de carbinoxamina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Solução oral | 40 + 1 + 0,4 mg/mL | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 207 | Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de carbinoxamina + citrato de pentoxiverina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 400 + 10 + 2 + 10 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 208 | Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de clorfeniramina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Cápsula dura, comprimido | 400 + 4 + 4 mg | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 209 | Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de clorfeniramina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Pó para solução oral | 80 + 0,8 + 0,8 mg/g | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 210 | Paracetamol + cloridrato de fenilefrina + maleato de clorfeniramina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Solução oral | 40 + 0,6 + 0,6 mg/mL | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 211 | Paracetamol + maleato de carbinoxamina | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Solução oral | 120 + 2 mg/mL | Sintomas da gripe e resfriado comuns, como febre, dor, coriza e congestão nasal. |
| 212 | Paracetamol + propifenazona + cafeína | N02B - Analgésicos e antipiréticos | Comprimido | 250 + 150 + 50 mg | Febre. Dores leves a moderadas, incluindo as associadas com gripes e resfriados comuns. |
| 213 | Permetrina | P03A - Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas | Emulsão dermatológica, suspensão dermatológica | 10 mg/mL | Pediculose. |
| 214 | Permetrina | P03A - Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas | Emulsão dermatológica, suspensão dermatológica | 50 mg/mL | Escabiose. |
| 215 | Picossulfato de sódio | A06A - Laxantes | Solução oral | 7,5 mg/mL | Laxativo. Prisão de ventre. Sob orientação de profissional de saúde: preparo diagnóstico ou cirúrgico. |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|
| 216 | Picossulfato de sódio + Cássia senna 1DH + Polygonum punctatum 1CH + Collinsonia canadensis 1CH | A06A - Laxantes | Comprimido | 0,005g+ 0,020 + 0,015 + 0,015 g | Laxativo. Prisão de ventre. |
| 217 | Picossulfato de sódio + óleo mineral leve + ágarágar | A06A - Laxantes | Emulsão oral | 0,334 + 282,25 + 2,72 mg/mL | Laxativo. Prisão de ventre. |
| 218 | Policarbofila cálcica | A06A - Laxantes | Comprimido revestido | 625 mg | Regularização do hábito intestinal. Constipação intestinal ou diarreia associadas a condições como diverticulose e síndrome do intestino irritável. |
| 219 | Policresuleno + cloridrato de cinchocaína | C05A - Agentes para tratamento de hemorroidas e fissuras anais de uso local | Pomada retal | 50 + 10 mg/g | Hemorroidas. Fissuras, prurido e eczemas da região do ânus. Curativo após cirurgias proctológicas. |
| 220 | Policresuleno + cloridrato de cinchocaína | C05A - Agentes para tratamento de hemorroidas e fissuras anais de uso local | Supositório | 100 + 27 mg | Hemorroidas. Fissuras, prurido e eczemas da região do ânus. Curativo após cirurgias proctológicas. |
| 221 | Polissulfato de mucopolissacarídeo | C05B - Terapia antivaricosa | Gel dermatológico, pomada dermatológica | 5 mg/g | Hematomas e inflamação provocada por varizes e em processos inflamatórios localizados. |
| 222 | Prometazina | D04A - Antipruriginosos, incluindo antihistamínicos, anestésicos e outros de uso local | Creme dermatológico | 20 mg/g | Prurido. Picada de insetos. |
| 223 | Racemtionina + cloreto de colina | A05B - Terapia biliar, lipotrópicos | Comprimido revestido | 100 + 20 mg | Distúrbios metabólicos hepáticos. |
| 224 | Racemtionina + cloreto de colina + inositol + cianocobalamina | A05B - Terapia biliar, lipotrópicos | Comprimido revestido | 100 + 25 + 50 + 0,002 mg | Distúrbios metabólicos hepáticos. |
| 225 | <i>Saccharomyces boulardii</i> | A07F - Microrganismos antidiarreicos | Cápsula dura, pó oral | 250 mg | Diarreias de diferentes causas. Restauração da flora intestinal. |
| 226 | Salicilato de etilenoglicol + levomentol + acetato de racealfatocoferol + cânfora | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Emplasto | 175 + 140 + 140 + 42 mg | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 227 | Salicilato de metila + cânfora + levomentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Adesivo dermatológico | 144 + 28,4 + 131 mg | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 228 | Salicilato de metila + cânfora + levomentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Pomada dermatológica | 52,5 + 44,4 + 20 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 229 | Salicilato de metila + | M02A - Produtos | Solução | 0,0333 | Dor e inflamação do sistema |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | cânfora + levomentol | para dor articular e muscular de uso local | dermatológica | mL/mL + 33,3 + 8,3 mg/mL | musculoesquelético. |
| 230 | Salicilato de metila + cânfora + mentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Pomada dermatológica | 52,5 + 44,4 + 20 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 231 | Salicilato de metila + cânfora + mentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Solução dermatológica | 0,0333 mL/mL + 33,3 + 8,3 mg/mL | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 232 | Salicilato de metila + extrato fluido de Beladona + cânfora | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Gel dermatológico | 40 + 13,6 + 10 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 233 | Salicilato de metila + iodo | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Pomada dermatológica | 50 + 50 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 234 | Salicilato de metila + levomentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Adesivo dermatológico | 105 + 31,5 mg | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 235 | Salicilato de metila + levomentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Gel dermatológico | 150 + 70 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 236 | Salicilato de metila + mentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Gel dermatológico, creme dermatológico | 150 + 100 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 237 | Salicilato de metila + mentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Pomada dermatológica | 250 + 250 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 238 | Salicilato de metila + mentol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Solução dermatológica | 50 + 10 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 239 | Salicilato de metila + óxido de zinco + bálsamo do peru + extrato fluido de Beladona + cânfora | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Pomada dermatológica | 50 + 90 + 20 + 16 + 10 mg/g | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 240 | Salicilato de metila + salicilato de etilenoglicol + levomentol + cânfora | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Solução dermatológica | 30 + 19 + 38,5 + 38,5 mg/mL | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 241 | Salicilato de metila + salicilato de etilenoglicol + levomentol + cânfora + timol | M02A - Produtos para dor articular e muscular de uso local | Emplasto | 144,14 + 21,84 + 131,04 + 28,4 + 18,34 mg | Dor e inflamação do sistema musculoesquelético. |
| 242 | Silimarina + racemetionina | A05B - Terapia biliar, lipotrópicos | Comprimido revestido | 70 + 100 mg | Distúrbios metabólicos hepáticos. |
| 243 | Sorbitol + laurilsulfato de sódio | A06A - Laxantes | Solução retal | 714 + 7,7 mg/g | Laxativo. Prisão de ventre. Sob orientação de profissional de saúde: preparo diagnóstico ou cirúrgico. |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------------------|----------------------------------|--|
| 244 | Subgalato de bismuto + óxido de zinco | D02A - Emolientes e protetores de uso local | Gel dermatológico | 1,5 + 45 mg/g | Dermatite de fraldas. Brotoejas. Irritações da pele de pequena intensidade provocadas pelo vento ou exposição prolongada ao sol. |
| 245 | Subgalato de bismuto + óxido de zinco + iodeto de timol | D08A - Antissépticos e desinfetantes de uso local | Pó dermatológico | 3,0 + 93,33 + 1,5 mg/g | Dermatite de fraldas. Brotoejas. Desodorante e antiperspirante dos pés e axilas. |
| 246 | Sulfato de magnésio + ácido cítrico + bicarbonato de sódio | A02A - Antiácidos | Pó efervescente | 176,5 + 367 + 436 mg/g | Alívio da azia e dor de estômago devido à má digestão. Laxante leve. |
| 247 | Sulfato de neomicina | D06A - Antibióticos de uso local | Pomada dermatológica | 5 mg/g | Infecções bacterianas da pele e mucosas, como impetigo e furúnculo. Eczemas e queimaduras infectados. Úlcera cutânea. |
| 248 | Sulfato de neomicina + bacitracina zíncica | D06A - Antibióticos de uso local | Pomada dermatológica | 5 mg/g + 250 UI/g | Infecções bacterianas da pele e mucosas, como impetigo e furúnculo. Eczemas e queimaduras infectados. Úlcera cutânea. Profilaxia de infecções cutânomucosas decorrentes de ferimentos cortantes. |
| 249 | Sulfato de neomicina + tartarato de bismuto e sódio + cloridrato de procaína | A01A - Preparações bucais | Suspensão de uso local | 25 + 25 + 15 mg/ml | Aftas e outras inflamações da mucosa da boca. |
| 250 | Sulfato de neomicina + tartarato de bismuto e sódio + cloridrato de procaína + mentol | A01A - Preparações bucais | Suspensão de uso local | 26 + 25 + 15 + 1 mg/ml | Aftas e outras inflamações da mucosa da boca. |
| 251 | Sulfato ferroso | B03 - Antianêmicos | Comprimido revestido | 190 mg | Anemias por deficiência de ferro. |
| 252 | Sulfato ferroso | B03 - Antianêmicos | Solução oral | 125 mg/mL | Anemias por deficiência de ferro. |
| 253 | Sulfeto de selênio | D01A - Antifúngicos de uso local | Xampu | 25 mg/mL | Caspa, dermatite seborreica, micose superficial do couro cabeludo. |
| 254 | Tintura Matricaria chamomilla L + cloridrato de lidocaína + polidocanol | A01A - Preparações bucais | Gel | 150 + 3,4 + 3,2 mg/g | Alívio dos desconfortos bucais da primeira dentição. |
| 255 | Tintura Matricaria chamomilla L., cloridrato de lidocaína, polidocanol | A01A - Preparações bucais | Solução | 150,0 mg/g + 3,4 mg/g + 3,2 mg/g | Alívio dos desconfortos bucais da primeira dentição. |
| 256 | Tioconazol | D01A - Antifúngicos de uso local | Creme dermatológico | 10 mg/g | Micoses superficiais de pele e unha e infecções mistas por fungos e bactérias. |
| 257 | Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina | R02A - Preparações para a garganta | Solução | 0,3 + 10 mg/mL | Aftas e outras inflamações na mucosa da boca. Dor de garganta. |
| 258 | Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina + benzocaína | R02A - Preparações para a garganta | Pastilha | 1 + 0,7 + 5 mg | Aftas e outras inflamações na mucosa da boca. Dor de garganta. |
| 259 | Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina + cloridrato de lidocaína | R02A - Preparações para a garganta | Solução | 0,1 + 2 + 4 mg/mL | Aftas e outras inflamações na mucosa da boca. Dor de garganta. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|-----------------------|---|
| 260 | Tirotricina + sulfato de hidroxiquinolina + fluoreto de sódio | A01A - Preparações bucais | Gel | 0,25 + 6,2 + 2,2 mg/g | Aftas e outras inflamações na mucosa da boca. Profilaxia da cárie. |
| 261 | Tribenosídeo + cloridrato de lidocaína | C05A - Agentes para tratamento de hemorroidas e fissuras anais de uso local | Creme retal | 50 + 20 mg/g | Hemorroidas internas e externas. |
| 262 | Tribenosídeo + cloridrato de lidocaína | C05A - Agentes para tratamento de hemorroidas e fissuras anais de uso local | Supositório | 400 + 40 mg | Hemorroidas internas e externas. |
| 263 | Ureia | D02A - Emolientes e protetores de uso local | Creme dermatológico | 200 mg/g | Pele seca e áspera. Espessamento da pele, ressecamento e descamação da pele, eczema e calosidade de mãos, cotovelos, joelhos e pés. |

ANEXO II

LISTA DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO (LMIP)

Fitoterápicos

| n | Espécie | Classe terapêutica | Parte empregada | Indicações terapêuticas e via de administração |
|---|--|---|-----------------|---|
| 1 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular | Sementes | Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Restrições: uso oral. |
| 2 | <i>Aloe ferox</i> + <i>Gentiana lutea</i> | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Rizoma + folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| 3 | <i>Aloe vera</i> | Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória | Folhas | Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral). Anti-inflamatório (uso tópico). |
| 4 | <i>Arnica montana</i> | Produtos com ação na pele e mucosas | Capítulo floral | Alívio dos sintomas de equimoses, hematomas e contusões. Uso tópico. |
| 5 | <i>Atropa belladonna</i> | Antiespasmódicos e anticolinérgicos gastrointestinais | Folhas | Alívio dos sintomas de cólicas e espasmos gastrintestinais. Uso oral. |
| 6 | <i>Calendula officinalis</i> | Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória | Flores | Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral). Anti-inflamatório (uso tópico). |
| 7 | <i>Cassia fistula</i> + <i>Senna alexandrina</i> | Laxantes irritantes ou estimulantes | Fruto + folhas | Constipação ocasional. Uso oral. |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 8 | <i>Centella asiatica</i> | Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular | Partes aéreas | Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Uso oral. |
| 9 | <i>Cinchona calisaya</i> | Estimulantes do apetite | Casca | Estimulante do apetite e para cansaço físico e mental. Uso oral. |
| 10 | <i>Cinnamomum zeylanicum + Caryophyllus aromaticus</i> | Outros produtos para o aparelho digestivo e metabolismo | Cascas + botões florais | Antiflatulento em casos de problemas digestivos. Uso oral. |
| 11 | <i>Crataegus oxyacantha + Salix alba + Passiflora incarnata</i> | Ansiolíticos | Flores + casca + flores | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| 12 | <i>Cynara scolymus</i> | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| 13 | <i>Cynara scolymus + Peumus boldus</i> | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folhas + folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| 14 | <i>Eucalyptus globulus</i> | Expectorantes | Folhas | Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral. |
| 15 | <i>Gentiana lutea + Chamaemelum nobile</i> | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Rizoma + raiz | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| 16 | <i>Glycine max</i> | Produtos para uso em ginecologia | Sementes | Auxiliar no alívio dos sintomas do climatério. Uso oral. |
| 17 | <i>Glycyrrhiza glabra</i> | Antiulcerosos | Raízes | Alívio dos sintomas digestivos incluindo queimação e dispepsia. Uso oral. |
| 18 | <i>Hamamelis virginiana</i> | Antihemorroidários tópicos e/ou terapia varicosa inclusive antihemorroidário | Folhas | Auxiliar no tratamento de hemorroidas externas e equimoses (uso tópico). Alívio do prurido e ardor associados a hemorroidas (uso oral). |
| 19 | <i>Harpagophytum procumbens</i> | Anti-inflamatórios ou antirreumáticos simples | Raízes secundárias | Alívio de dores articulares menores e dor lombar aguda. Uso oral. |
| 20 | <i>Hedera helix</i> | Expectorantes | Folhas | Expectorante em caso de tosse produtiva. Uso oral. |
| 21 | <i>Matricaria chamomilla + Gentiana lutea + Nux vomica + Peumus boldus</i> | Antiespasmódico | Flores + rizoma e raízes + sementes + folhas | Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias. Uso oral. |
| 22 | <i>Matricaria recutita</i> | Anti-inflamatórios. Cicatrizantes com ação anti-inflamatória | Capítulos florais | Cicatrizante, destinado ao tratamento de queimaduras térmicas leves. Anti-inflamatório. Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais e dos distúrbios gastrointestinais espásticos (uso oral). Anti-inflamatório (uso tópico). |
| 23 | <i>Maytenus ilicifolia</i> | Antiulcerosos | Folhas | Alívio dos sintomas digestivos incluindo queimação e dispepsia. Uso oral. |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 24 | <i>Maytenus ilicifolia</i> + <i>Jateoriza palmata</i> | Outros produtos para o aparelho digestivo e metabolismo | Folhas + raízes | Auxiliar no tratamento dos sintomas das dispepsias funcionais, principalmente na dor epigástrica. Uso oral. |
| 25 | <i>Melissa officinalis</i> | Antiespasmódico, ansiolítico, cicatrizantes | Folhas | Antiflatulento (combate gases), antiespasmódico e ansiolítico leve. Uso oral. |
| 26 | <i>Mikania glomerata</i> | Expectorantes | Folhas | Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral. |
| 27 | <i>Mikania glomerata</i> + <i>Polygala senega</i> + <i>Cephaelis ipecacuanha</i> | Expectorantes | Folhas + raízes + raízes | Antitussígeno, broncodilatador e expectorante. Uso oral. |
| 28 | <i>Nasturtium officinale</i> | Expectorantes | Partes aéreas | Antisséptico das vias aéreas superiores e expectorante. Broncodilatador. Uso oral. |
| 29 | <i>Operculina alata</i> | Laxantes irritantes ou estimulantes | Raiz | Laxativo, nos casos de constipação funcional aguda. Uso oral. |
| 30 | <i>Panax ginseng</i> | Neurotônico | Raiz | Para cansaço físico e mental. Uso oral. |
| 31 | <i>Passiflora alata</i> + <i>Erythrina mulungu</i> + <i>Crataegus oxycanta</i> | Ansiolíticos | Folhas + casca + flores e folhas | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| 32 | <i>Passiflora incarnata</i> | Ansiolíticos | Partes aéreas | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| 33 | <i>Passiflora incarnata</i> + <i>Crataegus oxyacanta</i> + <i>Salix alba</i> | Ansiolíticos | Flores e folhas + flores e folhas + casca | Ansiolítico leve. Auxiliar no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Uso oral. |
| 34 | <i>Paullinia cupana</i> | Neurotônico | Semente | Para cansaço físico e mental. Uso oral. |
| 35 | <i>Peumus boldus</i> | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folhas | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| 36 | <i>Peumus boldus</i> + <i>Frangula purshiana</i> + <i>Rheum palmatum</i> | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Folha + casca + rizoma e raiz | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| 37 | <i>Plantago ovata</i> | Laxantes incrementadores do bolo intestinal | Casca da semente | Auxiliar no tratamento de constipação intestinal. Constipação ocasional. Uso oral. |
| 38 | <i>Plantago ovata</i> + <i>Senna alexandrina</i> | Laxantes incrementadores do bolo intestinal | Semente e casca da semente + frutos | Auxiliar no tratamento de constipação intestinal. Constipação ocasional. Uso oral. |
| 39 | <i>Polygala senega</i> | Produtos para o aparelho respiratório | Raízes | Auxiliar no tratamento dos sintomas da bronquite crônica e da faringite. Uso oral. |
| 40 | <i>Polypodium leucatomos</i> Poir | Anti-inflamatório | Partes aéreas | Anti-inflamatório na profilaxia de irritação da pele agravada pelo sol. Uso oral. |
| 41 | <i>Rhamnus purshiana</i> | Laxantes irritantes ou estimulantes | Casca | Constipação ocasional. Uso oral. |
| 42 | <i>Rhodiola rosea</i> | Psicoestimulantes | Rizoma e raiz | Alívio temporário dos sintomas do estresse, tais como fadiga e sensação de fraqueza. Uso oral. |
| 43 | <i>Salix alba</i> | Analgésicos, anti-inflamatórios | Casca | Antitérmico, anti-inflamatório e analgésico. Uso oral. |
| 44 | <i>Senna alexandrina</i> | Laxantes irritantes ou | Folhas e frutos | Constipação ocasional. Uso oral. |

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|---|
| | | estimulantes | | |
| 45 | <i>Serenoa repens</i> | Produtos com ação no trato urinário | Frutos | Alívio dos sintomas do trato urinário baixo relacionados a hiperplasia prostática benigna depois que condições mais sérias tenham sido excluídas por um médico. Uso oral. |
| 46 | <i>Silybum marianum</i> | Digestivos, hepatoprotetores, colagogos e coleréticos com ou sem efeito antiespasmódico | Frutos sem papilho | Auxiliar no funcionamento da vesícula biliar. Auxiliar no tratamento dos sintomas da dispepsia funcional. Prevenção e tratamento auxiliar de distúrbios hepáticos e dos distúrbios gastrointestinais espásticos. Digestivo. Uso oral. |
| 47 | <i>Solidago microglossa</i> | Analgésicos, anti-inflamatórios | Partes aéreas | Anti-inflamatório nos casos de contusões, dores musculares e hematomas (uso tópico). Anti-inflamatório (uso oral). |
| 48 | <i>Symphytum officinale</i> | Analgésicos, anti-inflamatórios | Raiz | Alívio sintomático de entorses leves e contusões. Uso tópico. |
| 49 | <i>Trichilia catigua</i> + <i>Croton heliotropiifolius</i> + <i>Paullinia cupana</i> | Neurotônico | Cascas do caule + caules + sementes | Para cansaço físico e mental. Uso oral. |
| 50 | <i>Uncaria tomentosa</i> | Analgésicos, anti-inflamatórios | Casca do caule e raiz | Anti-inflamatório. Uso oral. |
| 51 | <i>Vitis vinífera</i> | Produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular | Folhas | Alívio dos sintomas relacionados a inchaços nas pernas, veias varicosas, sensação de peso, dor, cansaço, coceira, tensão nas pernas e câimbras na panturrilha. Uso oral. |
| 52 | <i>Zingiber officinale</i> | Antieméticos e antinauseantes | Rizomas | Profilaxia de náuseas causadas por movimento (cinetose) e pós-cirúrgicas. Uso oral. |